

فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المدارس ودور رعاية الأطفال

الإصدار 5: 31 أيار/مايو 2021

يجب فحص الطلاب والأطفال لفيروس كوفيد-19 كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال يمكن للوالدين/الأوصياء تعبئة هذا نيابة عن الطفل.

التاريخ (شهر-يوم-سنة) _____

أسئلة الفحص

1. في الـ 14 يومًا الماضية، هل سافر الطالب/الطفل خارج كندا؟
في حال الإغفاء من متطلبات الحجر الصحي الفدرالية، حدّد "لا".
2. هل أخبرك طبيب أو مقدم رعاية صحية أو وحدة صحة عامة بوجود عزل الطالب/الطفل حاليًا (البقاء في المنزل)؟
يمكن أن يكون هذا بسبب تفشي المرض أو تتبع المخالطة.
3. في الـ 14 يومًا الماضية، هل تم تحديد الطالب/الطفل على أنه "مخالط عن قرب" لشخص مصاب حاليًا بفيروس كوفيد-19؟
4. في الـ 14 يومًا الماضية، هل تلقى الطالب/الطفل تنبيهًا حول التعرض للإصابة بفيروس كوفيد-19 على هاتفه المحمول؟
إذا ذهب بالفعل للاختبار وحصل على نتيجة سلبية، فحدّد "لا".
5. هل يعاني الطالب/الطفل حاليًا من أي من هذه الأعراض؟
اختر أي / كل ما هو جديد ومتفاقم وغير مرتبط بأسباب أو ظروف أخرى معروفة لديه بالفعل.
-
- الحمى و/أو القشعريرة
درجة الحرارة 37.8 درجة مئوية / 100 درجة فهرنهايت أو أعلى
- السعال أو السعال النباحي (الخناق)
إصدار صوت صفير عند التنفس باستمرار وأكثر من المعتاد (غير مرتبط بالربو أو الممرات الهوائية التفاعلية بعد العدوى، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة لديه بالفعل)
- ضيق النفس
انقطاع النفس، غير قادر على التنفس بعمق (غير مرتبط بالربو، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة لديه بالفعل)
- انخفاض أو فقدان حاسة التذوق أو الشم
غير مرتبط بالحساسية الموسمية أو الاضطرابات العصبية أو التعرض للطقس البارد في الخارج، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة لديه بالفعل
- التهاب الحلق أو صعوبة البلع
البلع المؤلم (غير مرتبط بالحساسية الموسمية أو الارتجاع الحمضي، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة لديه بالفعل)
- سيلان أو انسداد/احتقان الأنف
غير مرتبط بالحساسية الموسمية أو التعرض للطقس البارد في الخارج، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة لديه بالفعل
- الصداع
صداع غير عادي وطويل الأمد (غير مرتبط بالصداع الناجم عن التوتر أو الصداع النصفي المزمن)
إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد-19 خلال الـ 48 ساعة الماضية ويعاني من صداع خفيف بدأ فقط بعد التطعيم، فحدّد "لا".

الغثيان والقيء و/أو الإسهال

نعم لا

غير مرتبط بمتلازمة القولون العصبي أو القلق أو تقلصات الدورة الشهرية أو أسباب أو حالات أخرى معروفة لديه بالفعل

التعب الشديد أو آلام العضلات

نعم لا

إرهاق غير عادي أو نقص في الطاقة أو سوء التغذية عند الرضع (غير مرتبط بالاكتئاب أو الأرق أو اختلال الغدة الدرقية أو الإصابة المفاجئة أو أسباب أو ظروف أخرى معروفة لديه بالفعل)

إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد-19 خلال الـ 48 ساعة الماضية ويعاني من تعب خفيف و/أو آلام عضلات/آلام مفاصل خفيفة بدأت فقط بعد التطعيم، فحدّد "لا".

6. هل يعاني شخص يعيش معه الطالب / الطفل حاليًا أي أعراض جديدة لمرض كوفيد-19. و/أو ينتظر نتائج

نعم لا

الاختبار بعد ظهور الأعراض؟

إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد-19 خلال الـ 48 ساعة الماضية ويعاني من صداع أو تعب أو آلام عضلات و/أو آلام مفاصل خفيفة بدأت فقط بعد التطعيم، فحدّد "لا".

نتائج أسئلة الفحص

إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 1 أو 3، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) لمدة 14 يومًا وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
- إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 1، اتبع إرشادات الصحة العامة. يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال بعد حصوله على خلو من الإصابة من وحدة الصحة العامة المحلية الخاصة بك.
- إذا أجبت بـ "نعم" على السؤال 3، تحدث مع طبيب/مقدم رعاية صحية للحصول على إرشادات أو تقييم، وإذا كان الطالب/الطفل بحاجة إلى اختبار كوفيد-19. لن يتمكن للطالب/الطفل من العودة إلى المدرسة/دار رعاية الأطفال إلا بعد 14 يومًا فقط، حتى لو حصل على نتيجة اختبار سلبية.
- إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة، مثل تورنتو أو بيل، فيجب على أشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا. هذا بسبب عوامل الخطر المحلية.
- إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من أونتاريو، فيمكن لأشقائك والأشخاص الآخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال أو العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية. اطلب من مدرستك/دار رعاية الأطفال مزيدًا من المعلومات.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض أو كانت نتيجة اختياره إيجابية، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من الإرشادات.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 2، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا في الحالات الطبية الطارئة.
- اتبع إرشادات الصحة العامة يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال بعد حصوله على خلو من الإصابة من وحدة الصحة العامة المحلية الخاصة بك.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من الإرشادات.
- إذا كنت تعيش في مناطق معينة من المقاطعة، مثل تورنتو أو بيل، فيجب على أشقائك وغيرهم من أفراد أسرتك البقاء في المنزل. هذا بسبب عوامل الخطر المحلية.
- إذا كنت تعيش في مناطق أخرى من أونتاريو، فيمكن لأشقائك والأشخاص الآخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال أو إلى العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية. اطلب من مدرستك/دار رعاية الأطفال مزيدًا من المعلومات.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.



إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 4، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا في الحالات الطبية الطارئة.
- قم بزيارة أحد مراكز التقييم للحصول على اختبار كوفيد-19.
 - إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية (غير مصاب بالفيروس)، فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال.
 - إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية (مصاب الفيروس)، فلن يتمكن الطالب/الطفل من العودة إلا بعد حصوله على خلو من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من الإرشادات.
- يمكن للأشخاص أو الأشخاص الآخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال أو العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية حتى تكون نتيجة الفرد الذي حصل على اختبارات تنبيه لفيروس كوفيد سلبية، أو حتى يحصل على خلو من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الأطفال لإعلامهم بهذه النتيجة.



إذا كانت إجابتك "نعم" على أي من الأعراض المشمولة في السؤال 6 أو السؤال 6، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
- إذا أجبت بـ "نعم" على السؤال 5، تحدث مع طبيب/مقدم رعاية صحية للحصول على إرشادات أو تقييم، وإذا كان الطالب/الطفل بحاجة إلى اختبار كوفيد-19.
- إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 6، فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة أو رعاية الطفل بعد أن يحصل على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19، أو يتم الإقرار بخلوه من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة المحلية، أو يتم تشخيصه بمرض آخر.
- يجب على الأشخاص أو الأفراد الآخرين في أسرتك البقاء في المنزل حتى تظهر الأعراض على الطالب/الطفل أو تظهر الاختبارات الفردية سلبية، أو يتم الإقرار بخلوه من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة الخاصة بك، أو يتم تشخيص إصابته بمرض آخر.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.



إذا أجبت بـ "لا" على جميع الأسئلة، فيمكن لطفلك أن يذهب إلى المدرسة/دار رعاية الأطفال لأنه يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض للإصابة بفيروس كوفيد-19. اتبع الإجراءات المعمول بها في مدرستك/مقدم رعاية الأطفال لإعلام الموظفين بهذه النتيجة (إذا كان ينطبق).

إذا تلقى الطالب/الطفل لقاح كوفيد-19 خلال الـ 48 ساعة الماضية وكان يعاني من صداع خفيف وإرهاق وآلام في العضلات و/أو آلام في المفاصل بدأت فقط بعد التطعيم، ولا توجد أعراض أخرى، فيجب عليه ارتداء كمامة مثبتة بطريقة صحيحة طوال مدة بقائه في المدرسة/ دار رعاية الأطفال. لا يجوز نزع الكمامة إلا لتناول الطعام أو الشراب، ويجب أن يبتعد الطالب/الطفل مترين على الأقل عن الآخرين عند نزع الكمامة. إذا ساءت الأعراض، واستمرت بعد 48 ساعة، أو إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض أخرى، فيجب عليه مغادرة المدرسة/دار رعاية الأطفال على الفور لعزل نفسه وطلب اختبار كوفيد-19.

الصحة العامة بأونتاريو – تتبع المخالطة

الإجابة على هذه الأسئلة اختياري. لن تستخدم هذه المعلومات إلا من قبل مسؤولي الصحة العامة لتتبع المخالطة. سيتم حذف جميع المعلومات بعد مرور 28 يومًا.

التاريخ: _____

الاسم: _____

رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني: _____