

أداة فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 للطلاب والأطفال في المدارس ودور رعاية الأطفال

الإصدار 3: 18 أكتوبر 2021

يجب فحص الطلاب والأطفال لفيروس كوفيد-19 كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال. يمكن للوالدين/الأوصياء تعبئة هذا الفحص نيابة عن الطفل.

التاريخ (شهر-يوم-سنة) _____

أسئلة الفحص

1. هل يعاني الطالب/الطفل حاليًا أيًا من هذه الأعراض؟

فيما يلي الأعراض المرتبطة بمرض كوفيد-19 الأكثر شيوعًا. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فعليك أن تعزل نفسك وإجراء اختبار. يرجى ملاحظة أنه لا ينبغي استخدام اختبار المستضد السريع للأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 أو للمخالطين لحالات معروفة بإصابتها بمرض كوفيد-19. يجب على أي شخص مريض أو تظهر عليه أي أعراض للمرض، بما في ذلك الأعراض غير المذكورة أدناه، البقاء في المنزل وطلب التقييم من مقدم الرعاية الصحية إذا لزم الأمر. اختر أي/كل ما هو جديد ومتفاجم وغير مرتبط بأسباب أو حالات أخرى معروفة وموجودة أصلاً عند الطالب/الطفل.

<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	الحمى و/أو القشعريرة درجة حرارة الجسم 37.8 مئوية / 100 درجة فهرنهايت
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	السعال أو السعال النباحي (الخانوق) صوت صفير يصدر عند التنفس باستمرار وأكثر من المعتاد (وهذا غير مرتبط بالربو أو الممرات الهوائية التفاعلية بعد العدوى، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة وموجودة أصلاً عند الطالب/الطفل)
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	ضيق النفس انقطاع النفس، أو عدم القدرة على التنفس بعمق (وهذا غير مرتبط بالربو، أو أسباب أو حالات أخرى معروفة وموجودة أصلاً عند الطالب/الطفل)
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	نقص أو فقدان الشهية أو الشَّم هذا غير مرتبط بحساسيات موسمية أو اضطرابات عصبية أو أسباب أو حالات أخرى معروفة وموجودة أصلاً عند الطالب/الطفل
<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	الغثيان والقيء و/أو الإسهال هذا غير مرتبط بمتلازمة القولون العصبي أو القلق أو تقلصات الدورة الشهرية أو أسباب أو حالات أخرى معروفة وموجودة أصلاً عند الطالب/الطفل

2. هل ينطبق أي مما يلي على الطالب / الطفل؟

- لقد تم تطعيمهم بالكامل لمرض كوفيد-19 (لقد مر 14 يومًا أو أكثر منذ جرعتهم النهائية إما من جرعتين أو جرعة واحدة من سلسلة اللقاحات)
 - لقد ثبتت إصابتهم بمرض كوفيد-19 في آخر 90 يومًا (ومنذ ذلك الحين تم عزلهم)
- إذا كانت الإجابة "نعم"، انتقل إلى الأسئلة 3 و 4 و 5
- لا يتم جمع المعلومات الصحية الشخصية عند إكمال أداة الفحص هذه. الغرض من هذا السؤال هو تقديم تعليمات عزل دقيقة، والتي تستند إلى حالة التطعيم وتاريخ الإصابة السابق.

3. هل يعاني شخص يعيش معه الطالب / الطفل حاليًا أي أعراض جديدة لمرض كوفيد-19 و/أو ينتظر نتائج الاختبار بعد ظهور الأعراض؟
- الأطفال (>18 سنة): حمى و/أو قشعريرة، سعال أو سُعال تُبَاحي، ضيق في التنفس، انخفاض أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، غثيان، قيء و/أو إسهال
- الكبار: (<18 سنة): حمى و/أو قشعريرة، سعال أو سُعال تُبَاحي، ضيق في التنفس، انخفاض أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، إرهاق، آلام في العضلات
- إذا تلقى الفرد الذي يعاني من أعراض لقاح كوفيد-19 خلال الـ 48 ساعة الماضية ويعاني فقط من إجهاد خفيف و/أو آلام في العضلات و/أو آلام في المفاصل بدأت فقط بعد التطعيم، فحدّد "لا".
4. خلال الـ 10 أيام الماضية، هل تم تحديد الطالب/الطفل على أنه "مخالط عن قرب" لشخص مصاب حاليًا بفيروس كوفيد-19؟
- إذا نصحتك الصحة العامة بأنك لست بحاجة إلى عزل نفسك، فحدّد "لا".
5. خلال الـ 10 أيام الماضية، هل تلقى الطالب/الطفل تنبيهًا حول التعرض للإصابة بفيروس كوفيد-19 على هاتفه المحمول؟
- إذا ظهرت نتيجة اختبار الطالب/الطفل سلبية بعد إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المخبري منذ ذلك الحين، فحدّد "لا".
6. هل ينطبق أي مما يلي؟
- في آخر 14 يومًا، سافر الطالب / الطفل خارج كندا وتم إخباره بالحجر الصحي
 - في آخر 14 يومًا، سافر الطالب / الطفل خارج كندا وطلب منه عدم الذهاب إلى المدرسة / رعاية الأطفال
- الرجاء الملاحظة إنه إذا لم يحصل الطفل/الطالب على التطعيم الكامل وتم إعفاؤه من الحجر الصحي الفدرالي لأنه سافر مع مرافق مُطعم، فيجب ألا يحضر إلى المدرسة أو دار الحضانة لمدة 14 يومًا. حدّد "نعم" إذا كان هذا ينطبق على الطفل/الطالب.
7. هل أخبرك طبيب أو مقدم رعاية صحية أو وحدة صحة عامة بوجوب عزل الطالب/الطفل حاليًا (البقاء في المنزل)؟
- يمكن أن يكون هذا بسبب تفشي المرض أو تتبع المخالطة.
8. خلال الـ 10 أيام الماضية، هل تبين من الفحص أن الطالب/الطفل مصاب باستخدام مستضد سريع أو مجموعة الفحص الذاتي في المنزل؟
- إذا ظهرت نتيجة اختبار الطالب/الطفل سلبية بعد إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المخبري منذ ذلك الحين، فحدّد "لا".

نتائج أسئلة الفحص

- إذا كانت إجابتك "نعم" على أي من الأعراض المشمولة في السؤال 6، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.
- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
 - تحدث مع طبيب/مقدم رعاية صحية للحصول على مشورة أو تقييم، وإذا كان الطالب/الطفل بحاجة إلى اختبار كوفيد-19.
 - يجب على الأصدقاء أو الأفراد الآخرين في أسرتك البقاء في المنزل حتى تظهر نتيجة الأعراض على الطالب/الطفل سلبية، أو يتم الإقرار بخلوه من الأعراض من قبل وحدة الصحة العامة في منطقتك، أو يتم تشخيص إصابته بمرض آخر. لا يُطلب من أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أصيبوا بمرض كوفيد-19 في آخر 90 يومًا وتم تطعيمهم وخلوهم من المرض منذ ذلك الحين البقاء في المنزل.
 - اتصل بمدرك/مقدم الرعاية للطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.
- إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 3، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.
- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
 - يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة أو دار رعاية الطفل بعد أن تظهر نتيجة الأعراض سلبية على الفرد، أو يتم التحقق من خلوه من الأعراض من قبل وحدة الصحة العامة المحلية، أو يتم تشخيص إصابته بمرض آخر.
 - اتصل بمدرك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.
- إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 4، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.
- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) لمدة 10 أيام وعدم المغادرة إلا لإجراء فحص أو لحالة طبية طارئة.
 - اتبع نصيحة وحدة الصحة العامة المحلية أو مقدم الرعاية الصحية، بما في ذلك الأعراض التي يجب مراقبتها ومتى يتم إجراء اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لمرض كوفيد-19. يرجى ملاحظة أن اختبار المستضد السريع لا يجب استخدامه لحالات معروفة بإصابتها بمرض كوفيد-19.

- لا يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال إلا بعد مرور 10 أيام، حتى لو حصل على نتيجة اختبار سلبية، طالما لم تظهر عليه أي أعراض.
- يمكن لأشقائك والأفراد الآخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال أو إلى العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية. لا يُطلب من أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أصيبوا بمرض كوفيد-19 في آخر 90 يوماً وتم تطعيمهم وخلوهم من المرض منذ ذلك الحين البقاء في المنزل.
- إذا أصيب الطالب / الطفل بأي من الأعراض المذكورة أعلاه أو كانت نتيجة الاختبارات إيجابية، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب / مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من النصائح.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 5، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
- اذهب إلى أحد مراكز التقييم للحصول على اختبار كوفيد-19.
- إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية في اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (غير مصاب بالفيروس)، فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال.
- إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية في اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR (مصاب الفيروس)، فيجب أن يبقى الطالب/الطفل في العزل الذاتي ولن يتمكن من العودة إلا بعد حصوله على خلو من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من الإرشادات.
- يمكن للأشخاص الآخرين في أسرتك الذهاب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال أو العمل، ولكن يجب عدم مغادرة المنزل لأسباب أخرى غير ضرورية حتى يتبين أن نتيجة اختبارات الفرد الذي حصل على تنبيه بإصابته بمرض كوفيد سلبية في اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، أو حتى يحصل على خلو من أعراض المرض من قبل وحدة الصحة العامة المحلية. لا يُطلب من أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أصيبوا بمرض كوفيد-19 في آخر 90 يوماً وتم تطعيمهم وخلوهم من المرض منذ ذلك الحين البقاء في المنزل.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 6، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل اتباع الإرشادات الفيدرالية للأفراد الذين سافروا خارج البلاد، بما في ذلك عدم الذهاب إلى المدرسة/دار رعاية الأطفال لمدة 14 يوماً بعد وصولهم وإجراء الاختبار وفقاً للمتطلبات الفيدرالية.
- إن تم توجيه الطالب/الطفل إلى عزل نفسه، فيجب عليه أن يبقى في المنزل لمدة 14 يوماً وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة. لمزيد من المعلومات حول المتطلبات الفيدرالية للمسافرين، يُرجى الاطلاع على موقع ويب حكومة كندا.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض أو كانت نتيجة اختبار إيجابية، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على المزيد من النصح والإرشاد.
- اتصل بمدرستك/مقدم الرعاية للطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 7، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
- اتبع إرشادات الصحة العامة يمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال بعد حصوله على خلو من الإصابة من وحدة الصحة العامة المحلية في منطقتك.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على المزيد من النصح والإرشاد.
- يجب على الأصدقاء أو الأفراد الآخرين في أسرتك البقاء في المنزل حتى تظهر نتيجة الأعراض على الطالب/الطفل سلبية، أو يتم الإقرار بخلوه من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة في منطقتك. لا يُطلب من أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أصيبوا بمرض كوفيد-19 في آخر 90 يوماً وتم تطعيمهم وخلوهم من المرض منذ ذلك الحين البقاء في المنزل.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الطفل لإعلامهم بهذه النتيجة.

إذا كانت إجابتك "نعم" على السؤال 8، فلا تذهب إلى المدرسة أو دار رعاية الأطفال.

- يجب على الطالب/الطفل عزل نفسه (البقاء في المنزل) وعدم المغادرة إلا لإجراء اختبار أو لحالة طبية طارئة.
- اذهب إلى أحد مراكز التقييم للحصول على اختبار كوفيد-19.
- إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية في اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (غير مصاب بالفيروس)، فيمكن للطالب/الطفل العودة إلى المدرسة/ دار رعاية الأطفال.
- إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية في اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (مصاب الفيروس)، فيجب أن يبقى الطالب/الطفل في العزل الذاتي ولن يتمكن من العودة إلا بعد حصوله على خلو من الإصابة من قبل وحدة الصحة العامة المحلية.
- إذا ظهرت على الطالب/الطفل أعراض، فاتصل بوحدة الصحة العامة المحلية أو الطبيب/مقدم الرعاية الصحية للحصول على مزيد من الإرشادات.

- يجب على الأصدقاء أو الأفراد الآخرين في أسرتك عزل أنفسهم حتى يتبين أن نتيجة فحص الفرد بالمستضد السريع أو مجموعة الاختبار الذاتي في المنزل سلبية من خلال إجراء اختبار فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو إثبات خلو الفرد من أعراض المرض من قبل وحدة الصحة العامة المحلية. لا يُطلب من أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم بالكامل أو أصيبوا بمرض كوفيد-19 في آخر 90 يومًا وتم تطعيمهم وخلوهم من المرض منذ ذلك الحين البقاء في المنزل.
- اتصل بمدرستك/مقدم رعاية الأطفال لإعلامهم بهذه النتيجة

إذا كانت إجابتك "لا" على جميع الأسئلة، فيمكن لطفلك أن يحضر إلى المدرسة/دار رعاية الأطفال. اتبع الإجراءات المعمول بها في مدرستك /مقدم رعاية الأطفال لإعلام الموظفين بهذه النتيجة.



- وفقًا للبروتوكولات الثابتة، يجب على جميع المرضى الذين يعانون من أي أعراض للمرض البقاء في المنزل، وطلب التقييم من مقدم الرعاية الصحية المنتظم إذا لزم الأمر.
- يجب على الأفراد الذين يعانون من أعراض حادة تتطلب رعاية طارئة الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ.
- إذا ظهرت على الفرد أعراض غير مذكورة في القائمة أعلاه، فقد توصي وحدة الصحة العامة بتدابير أخرى من بينها إجراء الاختبار بناءً على تقييم أعراض الفرد وتاريخ التعرض.

الصحة العامة بأونتاريو – تتبع المخالطة

الإجابة على هذه الأسئلة اختياري. لن تستخدم هذه المعلومات إلا من قبل مسؤولي الصحة العامة لتتبع المخالطة. سيتم حذف جميع المعلومات بعد مرور 28 يومًا.

التاريخ: _____

الاسم: _____

رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني: _____