

Outil de dépistage pour les écoles et les service de garde d'enfants

Version 5.0
Date de la dernière mise à jour :
31 août 2022

Date (jj-mm-aaaa) _____

Si la personne à dépister est immunodéprimée¹ ou si elle vit dans une habitation collective extrêmement vulnérable (par exemple, école dans un hôpital, programmes de partenariat pour l'éducation avec les établissements communautaires), ce n'est pas le bon outil de dépistage. Le bon outil se trouve sur le site <https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/>.

Le personnel, les élèves, les enfants et les visiteurs devraient effectuer un dépistage tous les jours avant d'aller à l'école ou au service de garde d'enfants. Les parents ou tuteurs et tuteurs peuvent remplir ce formulaire au nom d'un enfant ou d'un élève.

Toute personne malade ou présentant des symptômes de maladie qui sont nouveaux ou qui s'aggravent, y compris ceux qui ne figurent pas dans le présent outil de dépistage, doit rester chez elle jusqu'à ce que ses symptômes se soient améliorés depuis au moins 24 heures (ou 48 heures s'il s'agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée) et doit consulter au besoin un professionnel de la santé.

Questionnaire de dépistage

Pour les questions 1, 2 et 3, vous pouvez choisir « Non » pour tous les symptômes si **les deux conditions suivantes s'appliquent** :

- Vos symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (48 heures s'il s'agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée)
- Vous n'avez pas de fièvre

1. Avez-vous ressenti l'un ou plusieurs des symptômes suivants?

Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s'aggravent et qui ne sont pas liés à d'autres causes ou problèmes médicaux connus.

Fièvre ou frissons OUI NON

Toux OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus
(par exemple, bronchopneumopathie chronique obstructive)

Essoufflement OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive, insuffisance cardiaque chronique)

Diminution ou perte du goût ou de l'odorat OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus
(par exemple, polypes nasaux, allergies, troubles neurologiques)

Si vous avez répondu NON à toutes les questions, passez à la question suivante.

1. Parmi les exemples d'**immunodépression**, citons la chimiothérapie anticancéreuse, une infection par VIH non traitée avec un nombre de lymphocytes T CD4 inférieur à 200, une immunodéficience primaire combinée, la prise de plus de 20 mg/jour (ou l'équivalent) de prednisone pendant plus de 14 jours et la prise d'autres médicaments immunodépresseurs. Pour cet outil de dépistage, des facteurs tels que la vieillesse, le diabète et l'insuffisance rénale chronique au stade ultime ne sont généralement pas considérés comme immunodéprimés.

Si vous avez répondu « OUI » à l'un des symptômes énoncés à la question 1, ne vous rendez pas à l'école ou au centre de garde d'enfants et :

- Restez à la maison (auto-isolément) et n'allez pas à l'école ou au centre de garde d'enfants jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fièvre et que vos symptômes s'améliorent depuis au moins 24 heures (48 heures pour les nausées, les vomissements ou la diarrhée). Ne sortez pas, sauf pour vous faire tester, pour vous rendre dans un centre d'évaluation clinique ou en cas d'urgence médicale. Si vous présentez des symptômes graves tels que des douleurs thoraciques ou que vous avez du mal à respirer, rendez-vous au service des urgences le plus proche.
- Si le test de dépistage de la COVID-19 est disponible et que vous présentez un risque élevé de maladie grave, nous vous encourageons à vous faire tester avec 1 test PCR ou 1 test moléculaire rapide (si admissible) ou 2 tests antigéniques rapides effectués à un intervalle de 24 à 48 heures (le second test n'est pas nécessaire si le premier est positif).
- Si vous présentez un risque élevé de maladie grave, vous devriez vous faire tester dès que possible, compte tenu du délai de traitement pour la COVID-19. Vous pourriez bénéficier de thérapies disponibles pour prévenir une maladie grave. Pour l'instant, un résultat positif au test antigénique rapide est suffisant pour commencer le traitement contre la COVID-19 dans le cas des personnes admissibles, et il n'est pas nécessaire d'obtenir une confirmation par test PCR ou test moléculaire rapide. Pour en savoir plus sur les tests de dépistage de la COVID-19 et les options de traitement, consultez <https://covid-19.ontario.ca/fr/centres-de-depistage-et-devaluation-clinique-de-la-covid-19>.
- Pendant 10 jours après l'apparition de vos symptômes :
 - portez un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école et au centre de garde d'enfants)
 - évitez les activités non essentielles pour lesquelles il faut retirer son masque (par exemple, jouer d'un instrument à vent en classe de musique ou retirer son masque pour faire du sport, aller au restaurant)
 - évitez de rendre visite à toute personne immunodéprimée ou à risque élevé de maladie (par exemple, les personnes âgées)
 - évitez les visites non essentielles dans les cadres à haut risque, comme les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée

Remarque : Pour les personnes qui ont obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, ces mesures peuvent constituer des mesures de prévention supplémentaires contre la propagation de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires circulant dans la communauté.

- Les frères et sœurs et les autres personnes avec lesquelles vous vivez devraient prendre les mesures suivantes pendant 10 jours après leur dernière exposition à la personne présentant des symptômes de la COVID-19 :
 - s'auto-surveiller pour déceler les symptômes. Ils devraient s'isoler immédiatement s'ils développent un quelconque symptôme de la COVID-19 et subir un test de dépistage s'ils sont admissibles
 - porter un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école et au centre de garde d'enfants)
 - éviter les activités non essentielles pour lesquelles il faut retirer son masque (par exemple, jouer d'un instrument à vent en classe de musique ou retirer son masque pour faire du sport, aller au restaurant)
 - éviter les visites non essentielles à toute personne immunodéprimée ou à risque élevé de maladie (par exemple, les personnes âgées)
 - éviter les visites non essentielles dans les cadres à haut risque, comme les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée

Remarque : Quels que soient les résultats obtenus au test de dépistage de la COVID-19, ces mesures peuvent constituer des mesures de prévention supplémentaires contre la propagation de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires circulant dans la communauté.

- Vous n'avez pas besoin de revoir les autres questions de cet outil aujourd'hui. Réutilisez l'outil de dépistage chaque jour avant de vous rendre à l'école ou au centre de garde d'enfants.

2. Avez-vous ressenti l'un ou plusieurs des symptômes suivants?

Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s'aggravent et qui ne sont pas liés à d'autres causes ou problèmes médicaux connus que vous aviez déjà.

Douleurs musculaires ou douleurs articulaires OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe au cours des dernières 48 heures, arthrose, fibromyalgie)

Fatigue extrême OUI NON

Sensation générale de malaise, manque d'énergie, sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe au cours des dernières 48 heures, dépression, insomnie, dysfonctionnement thyroïdien, anémie, malignité)

Mal de gorge OUI NON

Déglutition douloureuse ou difficulté à avaler sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, écoulement post-nasal, reflux acide)

Nez qui coule ou nez bouché ou congestionné OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, allergies saisonnières, le fait de se trouver à l'extérieur par temps froid ou sinusite chronique)

Mal de tête OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, si vous avez reçu un vaccin contre la COVID-19 ou contre la grippe au cours des dernières 48 heures, céphalées de tension, migraines chroniques)

Nausées, vomissements ou diarrhée OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus (par exemple, vomissements transitoires dus à l'anxiété chez les enfants, dysfonctionnement chronique du système vestibulaire, syndrome du côlon irritable, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, effets secondaires des médicaments)

Si vous avez répondu « NON » à tous les symptômes, passez à la question suivante.

Si vous avez répondu « OUI » à au moins deux des symptômes énoncés à la question 2, suivez les directives données ci-dessus à la rubrique « Si vous avez répondu « OUI » à l'un des symptômes énoncés à la question 1 ».

Si vous avez répondu « OUI » à uniquement un des symptômes énoncés à la question 2, vous ne devez pas vous rendre à l'école ou dans un service de garde d'enfants, et :

- Vous devez rester à la maison jusqu'à ce que votre ou vos symptômes se soient améliorés depuis au moins 24 heures (48 heures s'il s'agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée), et tant que vous n'avez pas de fièvre.
- Vos frères et sœurs et les personnes avec lesquelles vous habitez n'ont pas besoin de rester à la maison tant qu'ils ne présentent pas de symptômes.
- Vous n'avez pas besoin de revoir les autres questions de cet outil aujourd'hui. Réutilisez l'outil de dépistage chaque jour avant de vous rendre à l'école ou au centre de garde d'enfants.

3. Avez-vous ressenti l'un ou plusieurs des symptômes suivants?

Cochez tous les symptômes qui sont nouvellement apparus ou qui s'aggravent et qui ne sont pas liés à d'autres causes ou problèmes médicaux connus que vous aviez déjà.

Douleurs abdominales OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus
(par exemple, crampes menstruelles, reflux gastroœsophagien pathologique)

Conjonctivite OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus
(par exemple, blépharite, orgelets récurrents)

Perte ou absence d'appétit (uniquement chez les jeunes enfants) OUI NON

Sans lien avec d'autres causes ou problèmes médicaux connus
(par exemple, anxiété, constipation)

Si vous avez répondu « NON » à tous les symptômes, passez à la question suivante.

Si vous avez répondu « OUI » à l'un des symptômes énoncés à la question 3, vous ne devez pas vous rendre à l'école ou dans un service de garde d'enfants, et :

- Vous devez rester à la maison jusqu'à ce que votre ou vos symptômes se soient améliorés depuis au moins 24 heures.
- Vos frères et sœurs et les personnes avec lesquelles vous habitez n'ont pas besoin de rester à la maison tant qu'ils ne présentent pas de symptômes.
- Vous n'avez pas besoin de revoir les autres questions de cet outil aujourd'hui. Réutilisez l'outil de dépistage chaque jour avant de vous rendre à l'école ou au centre de garde d'enfants.

4. Vous a-t-on demandé de vous mettre en quarantaine, de vous isoler, de rester à la maison ou de ne pas fréquenter l'école ou le service de garde d'enfants à l'heure actuelle? OUI NON

Il peut s'agir d'un ordre donné par un médecin, un fournisseur de soins de santé, un bureau de santé publique, un agent des services frontaliers fédéral ou une autre autorité gouvernementale.

Veillez noter que des exigences fédérales (https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.167924584.893587322.1660516599-70316887.1660516599) s'appliquent aux personnes qui ont voyagé à l'extérieur du Canada, même si elles sont exemptées de quarantaine.

Si vous avez répondu « NON », passez à la question suivante.

Si vous avez répondu « OUI » à la question 4, vous ne devez pas vous rendre à l'école ou dans un service de garde d'enfants, et :

- Vous devez rester à la maison et ne pas sortir sauf pour subir un test, obtenir une évaluation clinique ou en cas d'urgence médicale.
- Vous devez suivre toute autre directive qui vous a été donnée.
- Vos frères et sœurs et les personnes avec lesquelles vous habitez n'ont pas besoin de rester à la maison à moins qu'on ne leur ait aussi demandé de se mettre en quarantaine, de s'isoler ou de rester à la maison.
- Vous n'avez pas besoin de revoir les autres questions de cet outil aujourd'hui. Réutilisez l'outil de dépistage chaque jour avant de vous rendre à l'école ou au centre de garde d'enfants.

5. Au cours des 10 derniers jours, avez-vous reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19?

OUI NON

Il peut s'agir d'un résultat positif à un test PCR de dépistage de la COVID-19 réalisé en laboratoire, à un test moléculaire rapide, à un test antigénique rapide ou à un test réalisé en utilisant une trousse d'autodiagnostic à domicile.

Si vous avez répondu « NON », passez à la section ci-dessous intitulée « Si vous avez répondu « non » à toutes les questions ».

Si vous avez répondu « OUI » à la question 5 et que vous ne présentez pas de nouveaux symptômes ou des symptômes qui s'aggravent, vous pouvez vous rendre à l'école ou dans un service de garde d'enfants :

- Si vous présentez ou développez de nouveaux symptômes ou si vos symptômes s'aggravent, restez à la maison jusqu'à ce que vous n'avez plus de fièvre et que vos symptômes se soient améliorés depuis 24 heures (ou 48 heures s'il s'agit de nausées, de vomissements ou de diarrhée).
- Pendant 10 jours après avoir obtenu un résultat positif à votre test de dépistage de la COVID-19 (ou à compter de la date d'apparition des symptômes, celle de ces deux dates qui survient en premier) :
 - portez un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école et au centre de garde d'enfants)
 - évitez les activités non essentielles pour lesquelles il faut retirer son masque (par exemple, jouer d'un instrument à vent en classe de musique ou retirer son masque pour faire du sport, aller au restaurant)
 - évitez de rendre visite à toute personne immunodéprimée ou à risque élevé de maladie (par exemple, les personnes âgées)
 - évitez les visites non essentielles dans les cadres à haut risque, comme les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée

Remarque : Si vous avez obtenu un résultat positif au test de dépistage au cours des 10 derniers jours, vous devez quand même suivre ces instructions même si vous avez obtenu un résultat négatif plus tard.

- Vos frères et sœurs et les personnes avec lesquelles vous habitez devraient prendre les mesures suivantes pendant 10 jours après leur dernière exposition à la personne qui a obtenu un résultat positif à son test de dépistage :
 - s'auto-surveiller pour déceler les symptômes. Ils devraient s'isoler immédiatement s'ils développent un quelconque symptôme de la COVID-19 et subir un test de dépistage s'ils sont admissibles
 - porter un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école et au centre de garde d'enfants)
 - éviter les activités non essentielles pour lesquelles il faut retirer son masque (par exemple, jouer d'un instrument à vent en classe de musique ou retirer son masque pour faire du sport, aller au restaurant)
 - éviter les visites non essentielles à toute personne immunodéprimée ou à risque élevé de maladie (par exemple, les personnes âgées)
 - éviter les visites non essentielles dans les cadres à haut risque, comme les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, vous pouvez vous rendre à l'école ou au centre de garde d'enfants.

Si vous vous sentez malade ou si vous ne vous sentez pas bien, même si vous présentez des symptômes qui ne figurent pas dans cet outil de dépistage, vous devriez rester chez vous. Consultez un médecin si nécessaire. Les personnes présentant des symptômes graves nécessitant des soins d'urgence devraient se rendre au service des urgences le plus proche.

Faites ce test chaque jour avant d'aller à l'école ou au centre de garde d'enfants.

Si l'on vous a informé que vous étiez un contact étroit d'une personne présentant des symptômes ou atteinte de la COVID-19 au cours des 10 derniers jours après votre dernière exposition à cette personne :

- portez un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école et au centre de garde d'enfants)
- évitez les activités non essentielles pour lesquelles il faut retirer son masque (par exemple, jouer d'un instrument à vent en classe de musique ou retirer son masque pour faire du sport)
- évitez les visites non essentielles à toute personne immunodéprimée ou à risque élevé de maladie (par exemple, les personnes âgées)
- évitez les visites non essentielles dans les cadres à haut risque, comme les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée

Remarque : Même si vous avez obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, ces mesures peuvent constituer des mesures de prévention supplémentaires contre la propagation de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires circulant dans la communauté.

Si vous avez présenté des symptômes de la COVID-19 au cours des 10 derniers jours, vous devez pendant 10 jours après le début des symptômes :

- porter un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école et à la garderie)
- évitez les activités non essentielles pour lesquelles vous devez retirer votre masque (par exemple, jouer d'un instrument à vent en classe de musique ou retirer votre masque pour faire du sport; dîner au restaurant)
- éviter les visites non essentielles à toute personne immunodéprimée ou présentant un risque accru de maladie (par exemple, les personnes âgées)
- éviter les visites non essentielles dans les milieux les plus à risque, comme les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée

Remarque : Quant aux personnes ayant obtenu un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19, ces mesures peuvent constituer des mesures de prévention supplémentaires contre la propagation de la COVID-19 et d'autres virus respiratoires circulant dans la communauté.

Si vous avez été vacciné contre la COVID-19 ou la grippe au cours des dernières 48 heures et que vous présentez une fatigue légère, des douleurs musculaires/articulaires ou des maux de tête :

- Vous devriez porter un masque bien ajusté pendant toute la durée de votre présence à l'école/au centre de garde d'enfants si vous ressentez une légère fatigue/fatigue, des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires qui n'ont commencé qu'après la vaccination.
- Si vos symptômes s'aggravent, s'ils persistent au-delà de 48 heures ou si vous présentez d'autres symptômes, vous devez quitter l'école ou le centre de garde d'enfants immédiatement.

Si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours

- Vous devez suivre les directives fédérales (https://voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.163281653.893587322.1660516599-70316887.1660516599) après votre retour au Canada, même si vous n'avez pas été mis en quarantaine.

Conseils de santé et de sécurité

La suppression des exigences provinciales ne signifie pas que le risque de contracter la COVID-19 a disparu. Nous devons encore faire notre part pour nous protéger et protéger les autres contre la COVID-19. Pour ce faire, il faut faire preuve d'une bonne hygiène des mains et porter un masque lorsque cela est recommandé ou exigé.

Faites-vous vacciner contre la COVID-19 si vous êtes admissible

Les vaccins sont sûrs, efficaces et constituent le meilleur moyen de vous protéger, vous et votre entourage, contre les maladies infectieuses. Pour en savoir plus, cliquez sur <https://www.ontario.ca/fr/page/vaccins>.